

APPLICAZIONE FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE

OBIETTIVO ▼	PRIMI TRATTAMENTI CONTRO LA BATTERIOSI	BBCH 601 1° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (PRIMO STADIO)	BBCH 602 2° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (SECONDO STADIO)	BBCH 603 3° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (TERZO STADIO)	BBCH 604 4° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (QUARTO STADIO)	BBCH 81 IL 10% DEI FRUTTI PRESENTA UN TIPICO COLORE MATURO	PRIMA DELLA RACCOLTA
Favorire il superamento degli arresti vegetativi dovuti a stress	MEGAFOL (GEA 931) 2 L/ha 2° Applicazione: dopo 10 gg						
Stimolare la fioritura e l'allegagione		MC SET (GEA 524) 2L/ha	MC SET (GEA 524) 2L/ha	MC SET (GEA 524) 2L/ha	MC SET (GEA 524) 2L/ha		
Prevenire le carenze di Calcio e Magnesio			BREXIL DUO 2 Kg/ha	BREXIL DUO 2 Kg/ha	BREXIL DUO 2 Kg/ha		
Aiutare le piante a rimanere vigorose in condizioni ostili di crescita						KENDAL (GEA 249) 1,5 L/ha 2° Applicazione: ogni 10 gg	
Aumentare la produzione e l'equilibrio vegeto - produttivo							MC EXTRA (GEA 235) 1Kg/ha 1° Appl: 20 gg prima della raccolta 2° Appl: 10 gg prima della raccolta

Sono previste concimazioni e biostimolazioni radicali in fertirrigazione, in funzione delle caratteristiche del terreno e delle condizioni pedo-climatiche. Per maggiori informazioni, contattare il tecnico Valagro di zona.